

淋病 (Gonorrhoea)

亦称 gono

淋病是常见 STI，由细菌引起，性交时不戴避孕套会传染。

资料快速一览

- 最常见的淋病感染部位是尿道和宫颈，但也会感染肛门和喉咙
- 它通过与有淋病的伴侣不戴避孕套进行性交传染
- 实验室要对尿样和尿道、宫颈、喉咙或肛门拭子进行化验
- 抗生素对治疗淋病很有效

这是什么病？(What is this?)

淋病会感染尿道、宫颈、肛门、喉咙和眼睛。极少情况下，它会进入血流，引起发烧、关节疼痛和皮肤溃烂。

如果感染淋病，你可能注意不到任何症状。如果你表现出症状，它们可能包括：

- 阴茎、阴道或肛门排出异物
- 小便时有刺痛或灼烧感
- 嗓子发痒、发干

你怎么会得这种病？(How do you get it?)

淋病以生殖器分泌物为载体，通过与有淋病的人进行不戴保护措施性交、肛交或口交传染。

有哪些症状？(What are the symptoms?)

阴道 (Vagina)

如果你有阴道，大多数阴道淋病感染都没有症状。如果出现症状，它们会包括：

- 异常阴道分泌物
- 异常阴道出血
- 小便时不适
- 盆腔部位疼痛，特别是在性交时

阴茎 (Penis)

如果你有阴茎，症状会包括：

- 阴茎流黄色或白色分泌物
- 小便时疼痛或不适
- 阴茎开口处发红

肛门 (Anus)

大多数肛门淋病感染都没有症状。如果出现症状，它们会包括肛门流出分泌物和不适。

喉咙 (Throat)

大多数口腔淋病感染都没有症状。如果出现症状，它们会包括嗓子疼。

如何做检查？(How do you test for it?)

淋病的检查方法：

- 尿样检查
- 尿道、宫颈、喉咙或肛门拭子检查

这些检查通常能在你接触感染源后 2-4 天发现淋病。

如何治疗？(How is it treated?)

淋病要用抗生素治。

通常在 24 小时内症状就会减轻。如果治疗后一周还有症状，回去看医生。

开始治疗后一周内不得有任何性生活（戴避孕套或保护膜也不行）。

伴侣接受治疗后一周内不得与其有任何性生活。

不治疗的话是否出现并发症？ (Are there any complications if not treated?)

如果你有阴道和子宫，淋病不治的话会传到子宫和输卵管，引起盆腔炎（PID），该病会导致其他并发症，包括不孕症。



了解盆腔炎的更多资料：StaySTIFree (staystifree.org.au)

治疗后有可能复发吗？ (Is it likely to come back after treatment?)

以下情况淋病复发的可能性很小：

- 告诉伴侣情况，确保你现在的伴侣去看医生并接受治疗
- 一直和所有伴侣都使用避孕套或保护膜

如何保护自己？ (How can I protect myself?)

性交时使用避孕套或保护膜是保护自己不得淋病的最好办法。

告诉他们 (Let them know)

当你确诊得像这样的 STI 时，最近几个月所有性伴侣都应该让医生检查。

你所有的性伴侣（经常的和临时的）都要做检查，这非常重要，因为 STIs 不治的话以后有可能带来严重的问题。

如果你难以向你的伴侣启齿，你可以参考 [Let Them Know \(告诉他们\)](http://Let Them Know (告诉他们) (letthemknow.org.au)) (letthemknow.org.au)里的谈话、电子邮件、短信和信函样本，亲自或匿名向你的伴侣传递这方面的信息。

去哪里寻求帮助 (Where can I get help?)

- 去你附近的性健康诊所
- 去看你本地的医生
- 去你本地的社区健康中心

查找性健康服务机构：StaySTIFree (staystifree.org.au)

免责声明 (DISCLAIMER)

本资料单提供普通性健康信息，其意图不是替代咨询医生的需要。

如果你担心你的健康问题，你应该去请教医生。

如果你有紧急需要，你应该去最近的急诊部或拨打 000。