

المفطورة التناسلية (Mycoplasma genitalium)

المعروفة أيضاً باسم MG

المفطورة التناسلية (MG) هي عدوى بكتيرية يمكن أن تنتقل أثناء ممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري (الكوندوم).

حقائق سريعة (QUICK FACTS)

- المفطورة التناسلية هي من الأمراض المعدية المنقولة جنسياً التي تؤثر على عنق الرحم والإحليل مجرى البول والمستقيم
- لا يعاني معظم المصابين بالمفطورة التناسلية من أي أعراض على الإطلاق
- عادة ما يكون الفحص عبارة عن عينة بول أو مسحة من المهبل أو عنق الرحم، أو مسحة للشرج
- يمكن علاج المفطورة التناسلية بالمضادات الحيوية

ما هي؟ (What is this?)

المفطورة التناسلية (MG) هي من الأمراض المعدية المنقولة جنسياً التي تسببها البكتيريا وهي تؤثر على عنق الرحم والإحليل/مجري البول والمستقيم.

كيف تُصابون بها؟ (How do you get it?)

يمكن أن تنتقل المفطورة التناسلية عن طريق الاتصال الجنسي المهبل والشرجي دون الواقي الذكري (كوندوم) مع شخص لديه المفطورة التناسلية.

ما هي الاعراض؟ (What are the symptoms?)

المهبل (Vagina)

إذا كان لديكم مهبل، فقد تعاني من:

- ألم في أسفل البطن
- ألم أثناء ممارسة الجنس
- إفرازات مهبلية غير عادية
- ألم عند التبول
- نزيف مهبل غير طبيعي

القضيب (Penis)

- إذا كان لديكم قضيب، فقد تعاني من:
- ألم عند التبول
- إفرازات من القضيب

المستقيم (Rectum)

إذا كان لديكم التهاب في المستقيم، فقد تعانون من:

- ألم أو تهيج داخل فتحة الشرج
- نزيف شرجي

كيف يتم فحصكم للكشف عنها؟ (How do you test for it?)

إذا كان لديكم مهبل، فعادة ما يكون الفحص عبارة عن عينة بول أو مسحة من المهبل أو عنق الرحم.

إذا كان لديكم قضيبي، عادة ما يكون الفحص عبارة عن عينة بول.

إذا كان لديكم التهاب في المستقيم، فإن الفحص هو عبارة عن مسحة للشرج.

متى يتم فحصكم للكشف عنها؟ (When do you test for it?)

يوصى بإجراء فحص للكشف عن المפטورة التناسلية إذا كان لديكم أي من الأعراض المذكورة أعلاه. يوصى بإجراء الفحص للكشف عن المפטورة التناسلية كذلك إذا كان شريككم الجنسي يعاني من المפטورة التناسلية. لا يُنصح بإجراء فحص للأشخاص بدون أعراض، إلا إذا كانوا شركاء لشخص يعاني من المפטورة التناسلية.

كيف يتم علاجها؟ (How is it treated?)

يتم علاج المפטورة التناسلية أولاً بمجموعتين من المضادات الحيوية. يعالج هذا العلاج 80-90% من عدوى المפטورة التناسلية.

بعد 2-3 أسابيع من تناول المضادات الحيوية، يجب إجراء الفحص مرة أخرى للتأكد من فعالية المضادات الحيوية.

يجب ألا تمارسوا الجنس أو يجب عليكم استخدام الواقي الذكري بنسبة 100% من الوقت لجميع الاتصالات الجنسية حتى تحصلون أنتم وشريككم (شركاءكم) على نتيجة فحص للمפטورة التناسلية سلبية.

بسبب ارتفاع مقاومة الجسم للمضادات الحيوية، أصبحت المפטورة التناسلية عدوى يصعب علاجها.

مع تزايد حالات العدوى المقاومة بدرجة مرتفعة، من المهم تحقيق التوازن بين الضرر الناجم عن المزيد من المضادات الحيوية وبين الضرر الناجم عن المפטورة التناسلية.

قد تتسبب الجرعات المتكررة من المضادات الحيوية في بعض الأحيان بما يلي:

- آثار جانبية خطيرة
- تضرر بكتيريا الأمعاء وهي مهمة لصحة الإنسان
- مقاومة المضادات الحيوية بحيث لا تستطيع المضادات التغلب على البكتيريا الأخرى وتلك الموجودة في المجتمع

الهدف من علاج المפטورة التناسلية هو التخلص من الأعراض والعدوى.

ولكن في حالات العدوى المستمرة، إذا استمرت المפטورة التناسلية بالظهور في الفحوص التي يتم إجراؤها بعد العلاج بالمضادات الحيوية، فقد لا يكون العلاج منها ممكناً. ولا يُنصح بالضرورة بأخذ المزيد من العلاجات بالمضادات الحيوية أو لن يتم وصف المزيد منها ما لم تكن هناك أعراض.

هل هناك أي مضاعفات إذا لم يتم علاجها؟ (Are there any complications if not treated?)

إذا كان لديكم قضيبي، فلا يوجد أي دليل يشير إلى أن المפטورة التناسلية قد تُسبب أي مشاكل صحية خطيرة. إذا كان لديكم مهبل، قد تُسبب المפטورة التناسلية بالمرض الإلتهابي الحوضي (PID) في حوالي 5% من حالات الإصابة بالإلتهاب.

كيف يمكنني حماية نفسي؟ (How can I protect myself?)

يُعدّ استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي أفضل طريقة لحماية أنفسكم من المפטورة التناسلية.

أخبروهم (Let them know)



عندما يتم تشخيص إصابتكم بمرض مُعدي منقول جنسياً، يجب أن يخضع جميع شركائكم الجنسيين من الأشهر القليلة الماضية للفحوصات من قبل الطبيب.

ومن المهم جداً أن يتم فحص جميع شركائكم الجنسيين (المنتظمين والعرضيين) لأنه إذا لم يتم علاج الأمراض المُعدية المنقولة جنسياً فقد تسبب مشاكل خطيرة لاحقاً.

إذا كنتم تواجهون صعوبة في إخبار شركائكم، يمكنكم استخدام Let Them Know (letthemknow.org.au) للحصول على نموذج حول المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والرسائل الخطية التي يمكنكم إرسالها إلى شركائكم إما بشكل شخصي أو مجهول.

أين يمكنني الحصول على المساعدة؟ (Where can I get help?)

- من خلال زيارة خدمة الصحة الجنسية بالقرب منكم
- أو زيارة طبيبيكم المحلي
- أو زيارة مركز صحة المجتمع المحلي

اعثروا على خدمات الصحة الجنسية عبر staystifree.org.au StaySTIFree

إخلاء المسؤولية (DISCLAIMER)

توفّر صحيفة الحقائق هذه معلومات عامة عن الصحة الجنسية وليس المقصود بها أن تحل محل الحاجة إلى استشارة طبيبيكم.

إذا كانت لديكم مخاوف بشأن صحتكم، فيجب عليكم طلب المشورة من طبيبيكم.

إذا كنتم بحاجة إلى رعاية عاجلة، فيجب عليكم التوجّه إلى أقرب قسم للطوارئ أو الاتصال برقم الطوارئ 000.

