

# 마이코플라스마 제니탈리움 (Mycoplasma genitalium)

다른명칭: MG

마이코플라스마 제니탈리움 (MG)은 콘돔 없는 성관계 시에 전파될 수 있는 세균성 감염입니다.

### 간단한 사실 자료 (QUICK FACTS)

- 마이코플라스마 제니탈리움은 자궁경관 및 요도, 직장에 영향을 주는 STI(성병)입니다.
- 마이코플라스마 제니탈리움에 감염된 대부분의 사람들은 전혀 증상이 없습니다.
- 테스트는 대개 소변 샘플, 질 혹은 자궁경관 면봉 채취, 항문 면봉 채취로 행해집니다.
- 마이코플라스마 제니탈리움은 항생제로 치료 가능합니다

### MG 가 무엇인가요? (What is this?)

MG(마이코플라스마 제니탈리움)는 자궁경관, 요도 및 직장을 감염시키는 세균에 의해 초래되는 STI 입니다.

### 어떻게 발생하나요? (How do you get it?)

MG 는 MG 감염자와 콘돔 없이 질과 항문 성관계 시에 전염될 수 있습니다.

### 증상이 무엇인가요? (What are the symptoms?)

#### 질 (Vagina)

질이 있는 여성은, 아래와 같은 경험을 할 수도 있습니다.

- 아랫배 통증
- 성관계 시 통증
- 비정상적인 질 분비물
- 소변을 볼 때 통증
- 비정상적인 질 출혈

#### 음경 (Penis)

음경이 있는 남성은, 다음과 같은 경험을 할 수도 있습니다.

- 소변을 볼 때 통증
- 음경 분비물

### 직장 (Rectum)

직장 감염이 생기면, 아래와 같은 경험을 할 수도 있습니다.

- 항문 내부의 통증이나 가려움
- 항문 출혈

### 어떻게 테스트 하나요? (How do you test for it?)

질이 있는 여성의 테스트는 대개 소변 샘플, 질 혹은 자궁경관 면봉 채취로 행해집니다.

음경이 있는 남성의 테스트는 대개 소변 샘플로 행해집니다.

직장 감염이 있는 경우에는 항문 면봉 채취로 테스트합니다.

### 언제 테스트를 하나요? (When do you test for it?)

MG 테스트는 위에 열거된 증상이 있을 경우에 권장됩니다. MG 테스트는 성관계 파트너가 MG 감염자일 경우에도 권장됩니다. 파트너가 MG 에 감염된 경우가 아니면, 증상 없는 사람을 테스트하는 것이 권장되지 않습니다.

### 어떻게 치료 하나요? (How is it treated?)

MG 는 처음에 두 차례의 항생제로 치료합니다. MG 감염의 80~90%는 이 치료로 치유됩니다.

항생제 복용 2~3 주 후에는, 항생제의 효과 확인을 위해 다시 테스트를 받아야 합니다.

귀하와 파트너(들)의 MG 테스트가 음성 결과로 나올 때까지는 모든 성접촉 행위 시에 100% 콘돔을 사용하든지 아니면 성관계를 갖지 않아야 합니다.

항생제 내성 증가로 인해 MG 는 치료하기 어려운 감염이 되었습니다.

강한 내성 감염이 증가됨에 따라, 추가적 항생제가 초래하는 해로움과 MG 가 초래하는 해로움 사이의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.

반복되는 항생제 투여는 가끔 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다.

- 심각한 부작용
- 건강에 중요한 장내 박테리아 손상
- 기타 박테리아 및 지역 사회에서 항생제 내성 발생

MG 치료의 목적은 증상과 감염을 없애는 것입니다.

하지만 MG 가 항생제 치료 이후의 테스트에서도 여전히 발견되는 지속성 감염인 경우에는 치료가 되지 않을 수도 있습니다. 무증상인 경우, 추가적인 항생제 치료는 반드시 필요한 것으로 권장되거나 처방되지 않습니다.

### 치료하지 않을 경우 합병증이 생기나요? (Are there any complications if not treated?)

음경이 있는 남성의 경우에는, MG 가 심각한 건강 문제의 원인이라고 제시되는 증거는 없습니다.

질이 있는 여성의 경우에는 MG 감염의 약 5%가 골반내 염증 질환을 초래할 수 있습니다.

### 어떻게 자신을 보호할 수 있을까요? (How can I protect myself?)

질과 항문 성교 시에 콘돔을 사용하는 것이 MG 로부터 자신을 보호하는 최상의 방법입니다.

#### 파트너에게 알려주세요 (Let them know)

이와 같은 STI 로 진단을 받았을 때는 지난 몇 개월 동안의 귀하의 모든 성관계 파트너들은 의사의 검진을 받아야 합니다.

귀하의 모든 성관계 파트너들 (정기적 및 비정기적)이 검진을 받는 것이 중요한데 왜냐하면 STI 가 치료되지 않으면 나중에 심각한 문제를 초래할 수도 있기 때문입니다.

파트너들에게 말하기가 어려울 경우 Let Them Know ([letthemknow.org.au](http://letthemknow.org.au))를 이용하여 대화, 이메일, 텍스트 메시지 및 서신 샘플을 구한 후에 파트너들에게 개인적으로 혹은 익명으로 보낼 수 있습니다.

### 어디서 도움을 받을 수 있나요? (Where can I get help?)

- 가까운 성보건 서비스를 방문합니다.
- 거주 지역 의사를 만납니다.
- 거주 지역 보건 센터를 방문합니다.

StaySTIFree ([staystifree.org.au](http://staystifree.org.au))에서 성 보건 서비스를 찾아 보세요.

#### 법적 면책 조항 (DISCLAIMER)

이 안내 자료의 목적은 일반적인 성 보건 정보의 제공이며, 의사의 검진 필요성을 대체하는 것은 아닙니다.

건강에 대한 우려사항이 있으면 의사의 조언을 구해야 합니다.

긴급 치료가 필요한 경우 가까운 응급실로 가거나 000 에 전화해야 합니다.

# Stay**STI**Free

Victorian Sexual Health Network

## 사실 알아보기

## Get the facts

[staystifree.org.au](http://staystifree.org.au)