

La enfermedad inflamatoria pélvica (Pelvic inflammatory disease)

También conocida como EIP

La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es una inflamación o infección del sistema reproductor en la pelvis. La EIP puede estar causada por una ITS como la clamidia, la gonorrea y el micoplasma genital. Solo afecta a las personas con vagina y útero.

DATOS BÁSICOS

- La clamidia y gonorrea son las causas más comunes de EIP
- La EIP es común y no causa síntomas
- Utilizar preservativos con cualquier pareja nueva y hacerse análisis frecuentes de ITS puede ayudar a prevenir la EIP
- Si no se trata, la EIP puede cicatrizar las trompas de Falopio y causar infertilidad
- La EIP es poco común en personas que no son sexualmente activas, no tienen periodos menstruales o no tienen útero u ovarios

¿Qué es esto? (What is this?)

La EIP es una enfermedad o inflamación de los órganos en la pelvis, incluyendo el útero y las trompas de Falopio.

¿Cómo se infecta uno? (How do you get it?)

La EIP está normalmente causada por una infección bacteriana como la clamidia, la gonorrea y el micoplasma genital.

A veces la EIP se desarrolla después de procedimientos pélvicos tales como una interrupción del embarazo.

¿Qué síntomas tiene? (What are the symptoms?)

Muchas personas no presentan ningún síntoma.

Aquellos que presentan síntomas pueden tener:

- Secreción vaginal anormal
- Sangrado inusual
- Dolor en la parte baja abdominal
- Dolor durante las relaciones sexuales
- Incremento del dolor menstrual

¿Cómo me hago una prueba? (How do you test for it?)

La EIP es diagnosticada por un profesional de la salud que utiliza:

- Tu historial de síntomas
- Reconocimiento
- Análisis

Los análisis pueden incluir un análisis de ITS, la exclusión de embarazo y a veces, una ecografía.

¿Qué tratamiento tiene? (How is it treated?)

La EIP se trata con una combinación de antibióticos durante varias semanas.

Si a tu pareja le han diagnosticado EIP, deberías hacerte análisis de ITS incluyendo clamidia, gonorrea y micoplasma genital.

 Averigua más sobre la clamidia, la gonorrea y el micoplasma genital en **StaySTIFree**(staystifree.org.au)

¿Hay complicaciones si no se trata? (Are there any complications if not treated?)

La EIP sin tratar puede derivar en dolor pélvico crónico y puede dañar las trompas de Falopio, causando dificultades para quedarte embarazada o causar un embarazo ectópico.

Los estudios muestran que después de un episodio de EIP puede que tus posibilidades de quedarte embarazada decaigan hasta un 10%. Después de dos o tres episodios, esta cifra aumenta hasta el 50%.

¿Cómo me puedo proteger? (How can I protect myself?)

La mejor forma de protegerte de la EIP es:

- Utilizar preservativo o protector cuando tengas relaciones sexuales con una nueva pareja
- Hacerte análisis de salud sexual periódicamente

¿Dónde puedo conseguir ayuda? (Where can I get help?)

- Visita un servicio de salud sexual cercano
- Visita a tu doctor local
- Visita tu centro de salud comunitario local

Encuentra servicios de salud sexual en **StaySTIFree** (staystifree.org.au)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)

Esta hoja informativa proporciona información sexual general y no tiene intención de reemplazar la necesidad de consultar con tu doctor.

Si tienes alguna duda acerca de tu salud, busca asesoramiento con tu doctor.

Si necesitas atención urgente, acude a tu Servicio de Emergencias más cercano o llama al 000.