

梅毒 (Syphilis)

梅毒是一种细菌 STI，通过皮肤之间的接触传染。

资料快速一览

- 梅毒在与有梅毒的人进行口交、性交或肛交的过程中通过直接接触传染
- 各感染阶段有不同的症状；也有可能没有症状
- 检查手段通常是皮肤病变处的拭子检查或验血。
- 这可以根治，但如果不治，它会导致大脑、心脏和眼睛的严重问题
- 梅毒要用抗生素治疗

这是什么病？(What is this?)

梅毒是一种细菌引起的性传染病。

你怎么会得这种病？(How do you get it?)

梅毒在与有梅毒的人进行口交、性交或肛交的过程中通过直接接触传染。

如果长疮或起疹子，它的传染性非常强。

在怀孕期间母亲（或怀孕的人）会把梅毒传给婴儿。

有哪些症状？(What are the symptoms?)

不是所有有梅毒的人都有症状，在没有验血之前你可能都不知道你有梅毒。

梅毒感染分四个阶段。各感染阶段有不同的症状。有初期、二期、早期隐性梅毒的人会传染他们的性伴侣。

初期梅毒

- 通常在生殖器部位长硬的疮（溃疡），不痛。其他有性接触的部位也会长疮，比如口腔、宫颈或肛门。
- 你也许没有注意长疮，因为它通常不痛而且可能出现在身体的隐蔽部位。
- 通常感染后 3-4 周会长疮，但也可能更久，使之难以确定你何时感染的梅毒。
- 长疮后通常在 4 周内自己会好。即便疮好了，如果你没接受过治疗，你仍然有梅毒，会传染给别人。
- 如果不治，初期梅毒会转成二期梅毒。

二期梅毒

- 初次感染梅毒后 2-4 个月会出现症状，症状要持续几周时间。
- 背部、胸部、手脚的皮肤上会出现红疹。
- 出现红疹后，梅毒的传染性非常强。
- 其他症状包括发烧、腹股沟和腋窝的腺体肿大、生殖器起疹子、脱发和浑身疲劳。
- 如果初期或二期梅毒没有得到治疗，它就会转成隐性梅毒

隐性梅毒

- 这个阶段没有症状，只能通过验血来检测梅毒。
- 如果在隐性阶段及早诊断梅毒并给予治疗，那么一般就不会有什么问题。
- 隐性梅毒在头 12-24 个月会传染，之后传染性减弱。
- 如果你有隐性梅毒，你可能需要进一步做检查、去见专科医生、更长的治疗时间。
- 隐性梅毒如果不治，三分之一的人会转成三期梅毒。

三期梅毒

- 三期梅毒会带来严重健康问题，主要是脑部和心脏的问题。
- 在这个阶段梅毒不会传染，仍然可以治疗。

如何做检查？(How do you test for it?)

医生可能根据生殖器上长的疮或身上起的疹子的外形来诊断梅毒。

他们也许会做疮和疹子的拭子检查，以探查梅毒的 DNA（基因物质）。他们还会要求验血。验血检查抗体 - 你身体对感染的反应。产生抗体要 3 个月的时间，所以刚开始检查时有可能呈阴性。

一项抗体检查看梅毒的感染情况，一项抗体检查看感染的活跃程度。验血还用于监测你身体对治疗的反应，并协助推算你已经感染了多久。

如果你怀孕，应该通过验血来检查你是否有梅毒。这项验血很重要，这是为了保证你有梅毒的话可以得到治疗，不会把梅毒传给婴儿或引起孕期内的并发症。

如何治疗？ (How is it treated?)

梅毒要用青霉素治疗。如果你对青霉素过敏，可以用其他替代方法。

尽管治疗过程很简单，但重要的是要重复验血，检查治疗是否起到了效果。后续验血建议安排在治疗后的3个月、6个月和12个月。

用青霉素治疗后，有些人（特别是有早期梅毒的人）有感冒症状，症状持续24小时。症状包括发烧、疼痛、总体感觉不适。这些症状会消失，不需要专门治疗，只需多休息、多补液即可。

在你的疹子或疮完全消失之前以及治疗后至少一周之内你不应该有任何性生活。

不治疗的话是否出现并发症？ (Are there any complications if not treated?)

如果不治，有些人会转成三期梅毒。最初感染后10-30年的时间里都有可能发生这种转变。

三期梅毒会带来严重健康问题，主要是脑部和心脏的问题。

怀孕期间梅毒会给孩子带来问题，比如流产、早产、死胎和新生儿早夭。

如何保护自己？ (How do I protect myself?)

性交时戴避孕套或保护膜能极大减少感染梅毒的风险。

如果你怀孕，务必要在头三个月做梅毒筛查血检。

告诉他们 (Let them know)

当你确诊得像这样的 STI 时，最近几个月所有性伴侣都应该让医生检查。

你所有的性伴侣（经常的和临时的）都要做检查，这非常重要，因为 STIs 不治的话以后有可能带来严重的问题。

如果你难以向你的伴侣启齿，你可以参考 [Let Them Know \(告诉他们\)](http://letthemknow.org.au) (letthemknow.org.au)里的谈话、电子邮件、短信和信函样本，亲自或匿名向你的伴侣传递这方面的信息。

去哪里寻求帮助 (Where can I get help?)

- 去你附近的性健康诊所
- 去看你本地的医生
- 去你本地的社区健康中心

查找性健康服务机构：StaySTIFree (staystifree.org.au)

免责声明 (DISCLAIMER)

本资料单提供普通性健康信息，其意图不是替代咨询医生的需要。

如果你担心你的健康问题，你应该去请教医生。

如果你有紧急需要，你应该去最近的急诊部或拨打 000。